



TẬP ĐOÀN AN NÔNG
ANNONG GROUP



HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG CÔNG TY TẬP ĐOÀN AN NÔNG






HOẠT CHẤT

Metaldehyde

THUỐC DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG TRIOC ANNONG 12WG



- Là thuốc trừ ốc bươu vàng dạng bả mồi tiên tiến nhất, diệt ốc qua đường vị độc, gây nên hiện tượng chảy nhớt liên tục làm ốc mất nước và chết rất nhanh.

-**Liều lượng:** **Rãi 5kg/ha.**

-**Cách dùng:** Rãi thuốc sau khi sạ 10 - 20 ngày. Có thể trộn với phân để rải. Giữ nước trong ruộng từ 3-5 ngày



THUỐC DIỆT ỐC BƯƠU VÀNG BENRIDE 700WP

HOẠT CHẤT **Niclosamide**

Hàm lượng: 700 g/kg

CÔNG DỤNG:

Công ty đăng ký là thuốc trừ ốc bươu vàng, diệt ốc qua đường tiếp xúc, vị độc và xông hơi. Có hiệu lực kéo dài.

LIỀU LƯỢNG: 250g/ha

Cách dùng: Lượng nước phun 160 – 320 lít/ha. Phun thuốc trước khi sạ 1 ngày hoặc khi lúa đã xanh.



Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Lúa	Ốc bươu vàng	250 g/ha	Không xác định	Lượng nước phun 160 - 320 lít/ha. Phun thuốc trước khi sạ 1 ngày hoặc khi lúa đã xanh.





THUỐC TRỪ CỎ

300EC

XOPHICANNONG

HOẠT CHẤT

**Pretilachlor
Fenclorim**



CÔNG DỤNG: Công ty đăng ký là thuốc trừ cỏ chọn lọc, tiền nảy mầm.

LIỀU LƯỢNG: Phun 1 – 1.2 lít 1/ha.

***Cách dùng: Lượng thuốc phun 400 lít/ha.
Phun thuốc sau khi sạ 1-4 ngày.***



SIEUCO 350SC

HOẠT CHẤT

Cyhalofop-Butyl

Quinclorac

Pyrazosulfuron Ethyl

Ethoxysulfuron



Là thuốc trừ cỏ chọn lọc, lưu dẫn, hậu nảy mầm sớm -
Cyhalofop - Butyl: ức chế sự phát triển của các loại cỏ sau
khi phun, dẫn đến hoại tử .

-**Ethoxysulfuron**: Thuốc sẽ dừng quá trình tổng hợp Acid
Amin, ngăn cản việc đâm nhánh và phát triển lá , dễ dẫn đến
cỏ chết hoàn toàn.

-- **Pyrazosulfuron Ethyl** : lưu dẫn vào mô của cây cỏ.

-- **Quinclorac**: phá vỡ sự sinh trưởng của cây cỏ bằng cách
cản trở quá trình tổng hợp protein sự cân bằng hóc môn.

LIỀU LƯỢNG: 0.2 - 0.3 lít/ha

- Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc sau khi
sạ 7 – 15 ngày



THUỐC TRỪ SÂU RẦY

350SC

ANFAZA

HOẠT CHẤT

Thiamethoxam



CÔNG DỤNG: ANFAZA 350SC là thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn nhanh mạnh đặc trị bộ trĩ hại lúa; rệp sáp hại cà phê.

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Lúa	Bộ trĩ	30 ml/ha	10	Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha. Phun thuốc khi bộ trĩ xuất hiện
Cà phê	Rệp sáp	0.01 – 0.015%	10	Phun ướt đều cây trồng khi rệp xuất hiện



HOẠT CHẤT

Isoprothiolane

Sulfur

Tricyclazole



THUỐC TRỪ BỆNH

BIMMY 800.8WP

Bimmy 800.8WP là thuốc đặc trị đạo ôn lá (cháy lá), đạo ôn cổ bông (thối cổ gié) hại lúa. Sự kết hợp 3 hoạt chất chuyên phòng trừ nấm *Pyricularia oryzae* với tác động tiếp xúc, lưu dẫn mạnh, hiệu lực kéo dài ức chế nấm bệnh nhanh chóng, vết bệnh khô nhanh không lây lan sang cây khác.

LIỀU LƯỢNG: 0.4 - 0.6 kg/ha

Cách dùng: Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Lúa	Đạo ôn	0.4 – 0.6 kg/ha	14	Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%

Azoxystrobin
Difenoconazole

THUỐC TRỪ BỆNH 650WP MYFATOP


CÔNG DỤNG:

Myfatop 650WP là thuốc phòng trị hữu hiệu lem lép hạt/ lúa; nấm hồng/ cà phê.

LIỀU LƯỢNG:

-Nấm hồng/ cafe: 0.06% ; phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ hại khoảng 12-14%

-Lem lép hạt/ lúa: 0.4kg/ha ; phun thuốc khi lúa chuẩn bị trổ và khi lúa trổ đều.



Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Cà phê	Nấm hồng	0.06%	14	Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ hại khoảng 12-14%
Lúa	Lem lép hạt	0.4 kg/ha	14	Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trổ và khi lúa trổ đều



THUỐC TRỪ BỆNH

700WP

SIEUKHUAN

HOẠT CHẤT

LIỀU LƯỢNG: 0.5 kg/ha

Bronopol
Salicylic acid

Cách dùng: lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%.

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Lúa	Bạc lá	0.5 kg/ha	7	Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%

THUỐC TRỪ BỆNH SIEUKHUAN 700WP

CẢNH BÁO
Có hai màu nước phải
tiếp xúc với da hoặc hít phải

NEW

SIEUKHUAN 700WP

Thành phần: Bronopol..... 450 g/kg
Salicylic acid..... 250 g/kg

SỬ DỤNG PHÙ HỢP **USA**

ĐẶC TRỊ BẠC LÁ

15g

Công Dụng:

Sản phẩm là sự kết hợp giữa hai hoạt chất mới nhất là Bronopol và salicylic, có tác dụng phổ rộng, hiệu lực kéo dài, diệt trừ bệnh bạc lá gây hại trên cây lúa

Hướng Dẫn Sử Dụng:

Pha 15g/ bình 16-25 lít nước.
Phun 2 bình cho 1.000m².
Phun ngừa hoặc bệnh chớm xuất hiện.
Hướng dẫn an toàn và biện pháp sơ cứu:
xem trên nhãn phụ
Thời gian cách ly: 7 ngày
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

SĐK: 5046/CHKT-BVTV
Sở và nhà nước
NSX
HSD: 2 năm kể từ ngày sản xuất

Đăng ký, sản xuất thành phẩm, phân phối

CÔNG TY AN NÔNG
Lô H7, Đường số 5, KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
ĐT: (028) 37 62 63 64 - Fax: (028) 37 62 62 62

A GROUP

Biện pháp phòng trừ bệnh bạc lá

Piano 18EW

HOẠT CHẤT

Eugenol



Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Lúa	Đạo ôn, bạc lá, khô vằn, lem lép hạt,	180 – 220 ml/ha	7	Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh xuất hiện.
Cải bắp	Thối đen			
Hành	Thối nhũn			
Xoài	Thán thư	0.02 –		
Nho	Phấn trắng	0.03%		

Cách dùng: lượng nước phun
800 lít/ha. Phun thuốc khi
bệnh xuất hiện



Sieuchek 700WP



Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Lúa	Rầy nâu	0,4 kg/ha	14	Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi rầy tuổi 1-2

Cách dùng: lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi rầy tuổi 1-2

HOẠT CHẤT

Nitenpyram

Pymetrozine

Diflubenzuron

BIKIN 750WP

Đặc trị Đạo ôn, bạc lá trên lúa



Phạm vi và phương pháp sử dụng:

Scope and method of application :

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Lúa	Đạo ôn	0.5 kg/ha	14	Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%

HOẠT CHẤT

Bismethiazole

Sulfur

fenoxamil

Cách dùng: lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%.



CỎ CHÁY 200SL



HOẠT CHẤT

Diaquat dibromide

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Ngô	Cỏ	3.0 lít/ha	Không xác định	Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun 1 lần khi cỏ đang phát triển mạnh (khoảng 20- 25 ngày sau gieo).


Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun 1 lần khi cỏ đang phát triển mạnh (khoảng 20 – 25 ngày sau gieo)



ANNONG MANCO 80WP

220.00 mm

300.00 mm



Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
				Phun với lượng nước 500-800 lít cho 1 ha.
Nho	Phấn trắng	0.4%	5	Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%
Xoài	Thân thui	0.4%	5	
Cà chua	Sương mai	3.0 kg/ha	5	
Lúa	Lem lép hạt	3.0 kg/ha	7	Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trổ và khi lúa trổ đều

HOẠT CHẤT

mancozeb



NEWCO 500SL

HOẠT CHẤT

MCPA amine

Cách dùng: lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc vào giai đoạn 25-35 ngày sau trồng.

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Mía	Cỏ lá rộng	1.8 lít/ha	Không xác định	Lượng nước: 400-500 lít/ha Phun thuốc vào giai đoạn 25-35 ngày sau trồng.





ANNONGVIN 50SC

HOẠT CHẤT

hexaconazole

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Lúa	Bệnh khô vằn	1.0 lít/ha	7	Phun với 400 - 600 lít nước/ha
Lúa	Lem lép hạt	1.0 lít/ha	7	Phun với 400 - 600 lít nước /ha. Phun thuốc khi lúa bắt đầu trổ và khi lúa trổ hoàn toàn
Cà phê	Rỉ sắt	0.37%	7	Phun với 400 - 600 lít nước /ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng	Bệnh hại	Liều lượng	Thời gian phun
Lúa	Lem lép hạt Khô vằn	1 lít thuốc/ha Pha 50 ml cho 1 bình 20-25 lít, phun 2 bình cho 1.000m ² .	Phun khi bệnh mới xuất hiện. Với lem lép hạt phun: Lần 1: phun khi lúa trổ lác đác. Lần 2: phun sau khi lúa trổ hoàn toàn.
Cà phê	Rỉ sắt	Pha với nồng độ 0,37%	Phun ướt đều tán lá

Phun ngừa hoặc khi bệnh mới xuất hiện, phun lặp lại sau 7 ngày nếu bệnh nặng. Lượng nước sử dụng 400-600 lít/ha

Thời gian cách ly: ngưng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN, LẮC KỸ CHAI THUỐC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

Sản xuất: Công ty TNHH Tập Đoàn An Nông

Đăng ký và phân phối:



CÔNG TY TNHH AN NÔNG

Lô H7, đường số 5, KCN Hải Sơn, Đức hòa, Long An
ĐT: 028.37 62 63 64 - Fax: 028.37 62 82 62

THUỐC TRỪ BỆNH

CẢNH BÁO

Có thể có hại nếu nuốt phải,
tiếp xúc với da, hoặc hít phải

Annongvin 50SC

Thành phần:
Hexaconazole ...50 g/l

Công dụng: thuốc trừ nấm bệnh phổ tác động rộng, phòng trừ hữu hiệu nấm bệnh khô vằn, lem lép hạt hại lúa, rỉ sắt hại cà phê.

**ĐẶC TRỊ KHÔ VẦN, LEM LÉP HẠT
HẠI LÚA; RỈ SẮT HẠI CÀ PHÊ**

**Công nghệ hiện đại
Chất lượng tuyệt vời**

Thể tích thực

900ml



HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- ĐỂ XA TÂM VỚI CỦA TRẺ EM.
- ĐỌC KỸ NHÃN THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG.
- Không được hút thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này.
- Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: Tránh hít phải thuốc, tránh để thuốc tiếp xúc với da, miệng và mắt.
- Mang bảo hộ lao động phù hợp.
- Nếu bị dính thuốc, ngay lập tức thay quần áo bị dính thuốc, rửa kỹ bằng xà phòng với nhiều nước.
- Sau khi dùng: Rửa sạch dụng cụ, thiết bị và đồ bảo hộ lao động. Tắm rửa sạch sẽ với xà phòng.
- Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác; thu gom, xử lý đúng quy định.
- Để bao gói còn thừa (nếu có) ở nơi an toàn, tránh xa thức ăn, trẻ em và động vật.
- Bỏ bao gói sau sử dụng đúng nơi quy định.

Biện pháp sơ cứu: Nếu thuốc dính vào da, rửa sạch với nước và xà phòng, nếu thuốc bắn vào mắt, rửa sạch mắt dưới dòng nước sạch liên tục trong ít nhất 10 phút. Nếu bị ngộ độc, nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất mang theo nhãn thuốc gây ngộ độc.

SDK: 381/CNDKT-BVTV

Số lô sx:

NSX:

HSD: 2 năm kể từ ngày sx.



293x118mm

16



KITINI SUPER 750WP

HOẠT CHẤT

Fenoxanil

Sulfur

Tricyclazole

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Lúa	Đạo ôn	0.6-0.8 kg/ha	14	Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%

CÔNG DỤNG

KITINI SUPER 750WP là thuốc trừ nấm bệnh hỗn hợp mới với 3 hoạt chất tiên tiến (Fenoxanil, Tricyclazole & Sulfur) tác động nội hấp, lưu dẫn cực mạnh, đặc trị bệnh đạo ôn lá (cháy lá) và đạo ôn cổ bông (thối cổ gieo) gây hại trên lúa. KITINI SUPER 750WP hiệu quả cao, kéo dài giúp cây lúa phát triển tốt, tăng năng suất, hạt bông mẩy, chất lượng gạo tốt, ít bị gãy nát khi xay xát.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỆNH HẠI	THỜI ĐIỂM PHUN	CÁCH SỬ DỤNG
Đạo ôn lá (cháy lá)	Phun khi bệnh chớm xuất hiện.	Pha 25-30g/bình 20-25 lít. Phun 400-500 lít/ha, phun ướt đều cây trồng.
Đạo ôn cổ bông (thối cổ gieo).	Phun thuốc khi lúa chuẩn bị trổ và sau khi lúa trổ đều	

LƯU Ý: Phun thuốc lúc sáng sớm hoặc chiều mát.
THỜI GIAN CÁCH LY: 14 ngày.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN **Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng**

ĐỂ XA TẦM VỚI CỬA TRẺ EM.
ĐỌC KỸ NHỮNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG.
Không hút thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này.
Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: Tránh hít phải thuốc, tránh để thuốc tiếp xúc với da, miệng và mắt.
Dùng bao hồ lao động che phủ.
Mặc áo dài tay, quần dài, giày cao su, kính bảo hộ lao động, khẩu trang che mũi và miệng.
Sau khi dùng: Rửa sạch dụng cụ, thiết bị và đồ bảo hộ lao động. Tắm rửa sạch sẽ với xà phòng.
Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác: thu gom, xử lý đúng quy định.
Để bao gói còn thừa (nếu có) ở nơi an toàn, tránh xa thức ăn, trẻ em và động vật.
Số bao gói sau sử dụng đúng nơi quy định.

Biện pháp xử cứu: Nếu thuốc dính vào da, rửa sạch với nước và xà phòng; nếu thuốc bắn vào mắt, rửa sạch mắt dưới dòng nước sạch liên tục trong ít nhất 15 phút. Nếu bị ngộ độc, nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất trung theo nhà thuốc gây ngộ độc.

Đăng ký, sản xuất và phân phối
CÔNG TY TNHH AN NÔNG
Địa chỉ: Lô H7, Đường số 5, KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
Điện thoại: (028) 37 626364 - Fax: (028) 37628262

SỐ LÔ SẢN XUẤT
NSK
HSD: 2 năm kể từ ngày sản xuất

GOLDGUN 0.6EC

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Lúa	Rầy nâu	150 ml/ha	7	Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện.
Lúa	Sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ	150 ml/ha		
Cà chua, đậu tương	Sâu xanh	150 ml/ha		
Bắp cải	Sâu tơ	150 ml/ha		
Súp lơ	Sâu xanh da láng	150 ml/ha		
Thuốc lá	Rệp đào	150 ml/ha		
Chè	Rầy xanh, bọ cánh tơ	150 ml/ha	7	Phun ướt đều cây trồng khi sâu xuất hiện
Cam	Nhện đỏ	0.03%		
Cà phê	Rệp sáp	0.03%		

HOẠT CHẤT azadirachtin

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Trị sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu, sâu phao đục bẹ hại lúa; sâu tơ hại bắp cải; sâu xanh da láng hại bông cải (súp lơ); sâu xanh hại cà chua, đậu tương; rệp đào hại thuốc lá; rầy xanh, bọ cánh tơ hại chè:

Pha 15ml cho bình 16 đến 20 lít nước, phun 2 - 3 bình cho 1.000m²

- Trị nhện đỏ hại cam; rệp sáp hại cà phê: Phun ướt đều cây trồng với nồng độ 0,07 - 0,1%.

Thời điểm phun: Phun khi sâu rầy mới xuất hiện, phun lặp lại sau 7 đến 10 ngày nếu sâu hại nặng.

Chú ý: Thuốc có tác dụng gây ngán ăn nên sau khi phun thuốc sâu rầy sẽ không tiếp tục phá hoại cây trồng và bắt đầu chết sau 3 đến 14 ngày.

THUỐC TRỪ SÂU THẢO MỘC THẾ HỆ MỚI CẦN THẬN
BẢO QUẢN XA TRẺ EM

Gold Gun

Thành phần: Azadirachtin 0.6% w/w 0.6EC




DIỆT TRỪ SÂU, RẦY TRIỆT ĐỂ

Additive USA

AN TOÀN SỬ DỤNG: Thực hiện đầy đủ các quy định về bảo hộ lao động; không bỏ chai, gói thuốc đã sử dụng xuống ao hồ, nguồn nước. Bảo quản thuốc nơi khô ráo, thoáng mát, xa nguồn thức ăn, thức uống, xa tầm tay trẻ em.

SƠ CẤP CỨU: Thuốc dính vào da rửa bằng nước sạch với xà phòng, dính vào mắt rửa dưới dòng nước sạch trong vòng 15 phút. Bị ngộ độc, chuyển nạn nhân đến ngay cơ sở y tế gần nhất, nhớ mang theo nhãn thuốc gây ngộ độc.

THỜI GIAN CÁCH LY: Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 3 ngày.

Đăng ký: Công ty TNHH MTV GoldOcean
 Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An
 Sản xuất: Công ty TNHH Tập Đoàn An Nông
 Lô H7, Đường Số 5, KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
 GDK: 4911/CNDKT-BVTV. HSD: 2 năm kể từ ngày sản xuất
 Số lô sản xuất:
 NSX:

Thể tích thực
250ml





Dr.Jean 800EC

HOẠT CHẤT

**Methyl eugenol
propoxur**

THUỐC TRỪ RUỒI VÀNG ⚠ CẢNH BÁO

DR. JEAN 800EC

Thành phần: Methyl Eugenol 700 g/l

Propoxur 100 g/l

**TIÊU DIỆT RUỒI VÀNG
ĐỤC QUẢ**

Sử dụng chung với thức ăn cho ruồi vàng

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

Thê tích thực:

SML



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Hòa tan gói 5ml thuốc **DR. JEAN 800EC** vào chai 100ml thức ăn dẫn dụ, sử dụng 10-20ml hỗn hợp cho 1 bẫy.

Thời gian cách ly: không xác định
hướng dẫn an toàn: Xem trên hộp.

Xuất xứ: **Methyl Eugenol**: CCA Biochemical Co., Ltd - Jiangsu, P.R.C

Propoxur: HK Pesticide Enterprises Ltd - Kowloon, Hongkong

Đăng ký, gia công, đóng gói:

US Chemical Co., Ltd - Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An.

Đ/c sản xuất: Lô H7, đường số 5, KCN Hải Sơn, Long An

Lô và NSX: xem trên gói

HSD: 2 năm SDK: 5879/CNĐKT-BVTV



Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Cam	Ruồi đục quả	1-2 ml/ bẫy	Không xác định	Bẫy được làm bằng hộp nhựa, khoét lỗ ở thành hộp để ruồi dễ bay vào. Bên trong hộp có treo miếng bông gòn (hoặc vải) đã tẩm thuốc theo đúng liều lượng. Sau khi tẩm thuốc bẫy được treo trên cây cách mặt đất khoảng 1,5 - 2,0m. Xử lý lần đầu khi thấy ruồi đục quả xuất hiện, thường ở giai đoạn đậu quả.



Vinup 40EC

HOẠT CHẤT **Abamectin** **aradizachtin**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Vinup 40EC là thuốc trừ sâu sinh học, diệt trừ hiệu quả **Nhện đỏ hại cam**; Sâu tơ hại bắp cải; Sâu xanh da láng hại súp lơ, đậu tương; Sâu xanh hại cà chua; Bọ cánh tơ, rầy xanh hại chè; Rệp đào hại thuốc lá; Rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá hại lúa; Cách sử dụng:

Đối tượng	Liều lượng
Nhện đỏ	Phun với nồng độ 0,025 - 0,06 %
Sâu - Rầy	Pha 5-15 ml thuốc cho bình 20 - 25 lít phun 2 bình cho 1000m ²

Phun ướt đều cây trồng, khi sâu hại mới xuất hiện, phun lặp lại sau 5-7 ngày nếu sâu hại nặng.

THỜI GIÁN CÁCH LY: 3 ngày

SDK: 2690/ 12 RR

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC + THẢO MỘC  CẢNH BÁO

VINUP 40EC

Mạnh mẽ - Chống lùn thuốc
An toàn - Hiệu quả



NHỆN ĐỎ - SÂU - RẦY

THÀNH PHẦN: Abamectin 37 g/l; Azadirachtin 3 g/l
HƯỚNG DẪN AN TOÀN: Vui lòng xem trên nhãn phụ.

ĐỌC KỸ NHÃN PHỤ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Xuất xứ: Jiangsu Eastern Agrochemical Co., Ltd
No. 186 Dong tai Road, Hangtuming Town, Jiangsu, P.R.C
Đăng ký, gia công đóng gói & Phân phối:

CÔNG TY TNHH US. CHEMICAL

Địa chỉ: Lô B04 - 1 KCN Đức Hòa 1,
Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Long An.
ĐT: (08) 37 62 63 64 - Fax: (08) 37 62 82 62

HSD: 2 năm

Lô và NSX:



Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
				Lượng nước 400-600 lít/ha.
Chanh dây	Bọ trĩ	0.08%	7	Phun thuốc khi bọ trĩ khoảng 2-3 con/ ngọn
Chanh dây	Rệp đào	0.05%	7	Phun thuốc khi mật độ sâu khoảng 3-5 con/ lá
Chè	Nhện đỏ	250 ml/ha	7	Phun thuốc khi tỷ lệ búp bị hại khoảng 5%
Chè	Bọ xít muỗi	250 ml/ha	7	Phun thuốc khi tỷ lệ búp bị hại khoảng 5%
Cải bắp	Sâu khoang	350 ml/ha	7	Phun thuốc khi mật độ sâu khoảng 1-2 con/ cây
Cà phê	Sâu đục quả	0.10%	7	Phun thuốc khi tỷ lệ quả bị đục khoảng 5%
Vải	Sâu đục cuống	0.025%	7	Lượng nước 500-600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 mới xuất hiện
Lúa	Rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá	100 - 120 ml/ha	3	Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện.
Cải bắp	Sâu tơ			
Súp lơ, đậu tương	Sâu xanh da láng			
Cà chua	Sâu xanh			
Chè	Bọ cánh tơ, rầy xanh			
Thuốc lá	Rệp đào			
Cam	Nhện đỏ	0.025%		



Bigsun 600WP

HOẠT CHẤT

**Pyriproxyfen
tolfenpyrad**



Công Dụng:
Bigsun 600WP là sự kết hợp mới giữa các cơ chế tác động: ức chế hô hấp, ức chế sinh sản, ức chế trưởng thành của trứng, ấu trùng và con trưởng thành. Do đó, **Bigsun 600WP** rất hiệu quả, nhanh và kéo dài, đặc trị rầy nâu, nhện gié, sâu cuốn lá hại lúa; nhện đỏ, rệp sáp hại cà phê.

Hướng Dẫn Sử Dụng:
- **Rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié hại lúa:** Pha 15 - 20g cho bình 25 lít nước. Phun 1,5 bình/1.000m². Phun khi sâu hại mới xuất hiện.
Với rầy nâu, phun kỹ vào gốc lúa nơi rầy trú ẩn khi rầy tuổi 1-2. Khi lúa lớn (sau 40 ngày) hoặc mật độ rầy cao có thể phun 2 bình cho 1.000m².
- **Nhện đỏ, rệp sáp hại cà phê:** Phun ướt đều tán lá với nồng độ 0.05 - 0.10%, phun lặp lại sau 7 ngày nếu bị nặng.

AN TOÀN SỬ DỤNG: Thực hiện các quy định về bảo hộ lao động. Bảo quản thuốc nơi khô ráo, thoáng mát, xa thức phẩm; xa tầm tay trẻ em.
SƠ CẤP CỨU: Thuốc dính vào da, mắt phải rửa bằng nước sạch nhiều lần. Bị ngộ độc, đưa đến cơ sở y tế gần nhất, nhớ mang theo nhãn thuốc gây ngộ độc.

THỜI GIẢN CÁCH LY: 7 ngày.
Xuất xứ: HK PESTICIDE ENTERPRISES LTD.
20 Carnarvon Road, Tsimsha Tsui, Kowloon, HongKong.
Đăng ký tên thương mại và sản xuất: An Nong Co., Ltd - H.Đức Hòa-Long An
Đơn vị phân phối:

USAGRO CO., LTD
Lô H9A, Đường số 5, KCN Hải Sơn, H.Đức Hòa-Long An
ĐT Tổng đại Group: 0723.779900 - Fax: 0723.779901
Email: annongvn@gmail.com - Website: www.annong.com.vn

SDK: 3350/ 12 FR
HSD: 02 năm
NSX:

15g

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Lúa	Sâu cuốn lá	0.2 kg/ha	7	Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi mật độ sâu khoảng 10-20 con/m ²
Cà phê	Rệp sáp	0.05%	7	Lượng nước 600-800 lít/ha. Phun khi mật độ rệp sáp 5-7 con/chùm quả
Lúa	Rầy nâu	0.3 kg/ha	7	Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi mật độ rầy nâu khoảng 20-40 con/ khóm hoặc 2-5 con/ danh
Lúa	Nhện gié	0.4 kg/ha	7	Lượng nước phun 500 - 600 lít/ha. Phun thuốc khi lúa ở giai đoạn làm đồng hoặc tỷ lệ danh bị hại khoảng 5%



Newtime 700WP

HOẠT CHẤT Tebufenpyrad Buprofezin



Thuốc trừ sâu NEWTIME 700WP

Thành phần:
Tebufenpyrad ... 250 g/kg
Buprofezin 450 g/kg

Công dụng: Newtime 700WP là thuốc phòng và trừ Nhện gié hại lúa - Nhện đỏ hại cà phê

Đặc trị:
Nhện gié - Nhện đỏ

Thời gian cách ly: 14 ngày

Xuất xứ: HK PESTICIDE ENTERPRISE LTD
20 Camaron Road, TsimSha Tsui, Kowloon, HongKong

ĐĂNG KÝ, GIA CÔNG ĐÓNG GỖ VÀ PHÂN PHỐI
CÔNG TY AN NÔNG
Lô B06 - 1, KCN Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc - Đức Hòa - Long An
ĐT: (08) 37 62 63 64 / Fax: (08) 37 62 82 82

Thuốc trừ sâu NEWTIME 700WP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Có thể phun phòng ngừa và trừ:

Lúa: Pha 10 - 15g/bình 25 lít nước, phun 2/bình cho 1.000m².

Lưu ý: - Phun khi rầy còn nhỏ (tuổi 1 - tuổi 2)
- Phun trừ nhện gié khi lúa làm đồng

Nhện đỏ: Phun với nồng độ 0.05 - 0.1%, phun khi mật độ 3 - 5 con / lá, lượng nước phun 500 - 800 lít/ha.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN:

- ĐỂ XA TÂM VỚI CỬA TRẺ EM.
- ĐỌC KỸ NHÃN THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG.
- Không hút thuốc, ăn hoặc uống trong khi sử dụng sản phẩm này.
- Khi tiếp xúc hoặc chuẩn bị thuốc: Tránh hít phải thuốc, tránh để thuốc tiếp xúc với da, miệng và mắt.
- Mang bảo hộ lao động phù hợp.
- Nếu bị dính thuốc, ngay lập tức cởi quần áo bị dính thuốc, rửa kỹ bằng nhiều nước.
- Sau khi dùng: Rửa sạch tay và tắm rửa. Rửa sạch trang bị bảo hộ lao động.
- Không sử dụng lại bao gói này vì bất kỳ mục đích nào khác.
- Để bao gói ở nơi an toàn, tránh xa thức ăn, trẻ em và động vật.
- Bỏ bao gói sau sử dụng đúng nơi quy định.

Thời gian cách ly: 14 ngày

Xuất xứ: HK PESTICIDE ENTERPRISE LTD
20 Camaron Road, TsimSha Tsui, Kowloon, HongKong

KHỐI LƯỢNG TÍNH: 15g

SĐK: 2157/13 SRai
Lô và NSX:

HSD: 2 năm

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Lúa	Nhện gié	0.2-0.3 kg/ha	7	Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc khi lúa làm đồng
Cà phê	Nhện đỏ	0.05-0.1%	7	Phun ướt đều cây trồng khi nhện khoảng 3-5 con/ lá



BRACYLIC 152WP

HOẠT CHẤT

Brassinolide

Salicylic acid

Cảnh báo
Có thể có hại nếu nuốt phải,
tiếp xúc với da, hoặc hít phải

THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

Bracylic 152WP

Thành phần: Brassinolide...2 g/kg; Salicylic acid ... 150 g/kg

SẢN PHẨM AN TOÀN
YÊU CHUẨN
VIETGAP
NÔNG SẢN
AN TOÀN

Kích thích sinh trưởng

**Giải pháp hữu hiệu
TĂNG KHẢ NĂNG
ĐỀ KHÁNG
CHO CÂY TRỒNG**
An toàn - Thân thiện
Với cây trồng và con người

**KÍCH THÍCH PHÁT TRIỂN
NĂNG CAO CHẤT LƯỢNG
GIÀ TĂNG NĂNG SUẤT**

Khối lượng tịnh **3g**

Độc ký hướng dẫn trước khi sử dụng
Đăng ký, sản xuất, phân phối:
CTY TNHH AN NÔNG
Lô H7, đường số 5, KCN Hải Sơn, Huyện Đức Hòa, Long An
ĐT: 028 3762 6364 - Fax: 028 3762 6262

THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

Bracylic 152WP

Thành phần: Brassinolide...2 g/kg; Salicylic acid ... 150 g/kg

Công dụng:
BRACYLIC 152WP với thành phần Brassinolide và Salicylic Acid là chất điều hòa sinh trưởng thực vật, không độc hại, thâm nhập nhanh và mạnh mẽ vào cây trồng, làm cây trồng tăng trưởng nhanh chóng:

- Thúc đẩy thụ tinh.
- Làm khả năng quang hợp, tăng hàm lượng diệp lục.
- Kích thích phát triển rễ cây.
- Nâng cao sức đề kháng của cây trồng.
- Duy trì thời gian bảo quản hoa và quả.
- Tăng sức chịu hạn, kháng kiềm, tăng khả năng kháng bệnh, giúp cây trồng nhanh chóng hồi phục sau chấn thương, tổn thương.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng	Liều lượng và cách dùng
Đậu tương	Pha 2.5-3g với 16 lít nước. Phun 2 bình cho 1.000m ² Phun thuốc khi cây hình thành quả non hay hạt
Xoài	Liều lượng: 0,01%. Lượng nước dùng: 600-800 lít/ha. Phun thuốc 2 lần: Lần 1: trước khi ra hoa, Lần 2: khi hình thành trái non
Cải xanh	Pha 2.5-3g với 16 lít nước. Phun 2 bình cho 1.000m ² Phun 2 lần: Lần 1: sau gieo trồng 10 ngày; Lần 2: sau gieo trồng 20-25 ngày
Lúa	Pha 2.5-3g với 16 lít nước. Phun 2 bình cho 1.000m ² Phun 3 lần: Lần 1: 15 ngày sau sạ; Lần 2: khi lúa làm đòng; Lần 3: khi lúa trổ đều

Thời gian cách ly: 03 ngày.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN: vui lòng xem trên nhãn phụ.

Biện pháp sơ cứu: Nếu thuốc dính vào da, rửa sạch với nước và xà phòng, nếu thuốc bắn vào mắt, rửa sạch mắt dưới dòng nước sạch liên tục trong ít nhất 10 phút. Nếu bị ngộ độc, nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất mang theo nhãn thuốc gây ngộ độc.

SDK: 6482/CNDKT-BVTV
Số lô sx và NSX: Xem trên bao bì
HSD: 2 năm kể từ ngày sx.

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Đậu tương	Kích thích sinh trưởng	200 g/ha	3	Lượng nước phun 400-500 lít/ha, phun thuốc khi cây có quả non
Xoài	Kích thích sinh trưởng	0.5%	3	Lượng nước phun 600-700 lít/ha, Phun thuốc vào giai đoạn khi cây chuẩn bị ra hoa, nuôi quả non và trước khi thu hoạch 10 ngày
Cải xanh	Kích thích sinh trưởng	100 - 200 g/ha	3	Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc 2 lần: lần 1 sau khi gieo hạt 10 ngày; lần 2 sau lần 1 là 10 ngày
Lúa	Kích thích sinh trưởng	100 - 200 g/ha	3	Lượng nước phun 400 - 500 lít/ha. Phun thuốc 3 lần, lần 1: sau khi sạ 5-15 ngày; lần 2: trước khi trổ 5 ngày; lần 3: sau khi lúa trổ hoàn toàn



DK-ANNONG 909EC

HOẠT CHẤT Petroleum spray oil



Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Cam	Nhện đỏ	0.5 - 1%	3	Phun ướt đều cây trồng khi mật độ nhện đỏ khoảng 3-5 con/ lá
Chè	Rầy xanh	0.5 - 1%	3	Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi rầy xuất hiện
Cà phê	Rệp sáp	1%	3	Phun ướt đều cây trồng khi mật độ rệp khoảng 5-7 con/ chùm quả



SHERTOX 5EC

HOẠT CHẤT **Cypermethrin**

THUỐC TRỪ SÂU



Shertox 5EC

Thành phần: Cypermethrin.....50 g/l

BỘ XÍT, SÂU KEO, RỆP VÂY CHO LÚA, CÀ PHÊ



Sản xuất: Cty TNHH Tập Đoàn An Nông
Đăng ký và phân phối:

CÔNG TY TNHH AN NÔNG

Địa chỉ: Lô H7, đường số 5, KCN Hải Sơn, Đức Hòa, Long An
ĐT: (028) 37 62 63 64 / Fax: (028) 37 62 82 62

THỂ TÍCH THỰC: **450ml**

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Lúa	Bộ xít	0.4 – 0.8 lít/ha	7	Lượng nước phun 320 – 400 lít/ha
Cà phê	Rệp vảy	0.1 – 0.15 %		Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.
Lúa	Sâu keo	0.8 lít/ha	14	Phun với 400 lít nước/ha. Phun khi mật độ sâu 2 con/cây.



ASSASSAIN 300EC



Thuốc trừ sâu
ASSASSAIN 300EC

Nguy hiểm
Ngộ độc nếu nuốt phải,
tiếp xúc với da, hoặc hít phải

A GROUP

Sắt thủ
ASSASSAIN

Đặc trị
Nhện gié
Sâu cuốn lá
Sâu khoang
Sâu xanh da láng

ADDITIVE
USA

Thành phần:
Pyriproxyfen 50g/l
Quinalphos 250g/l

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Cà phê	Rệp sáp	0.2%	14	Lượng nước phun 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi rệp sáp khoảng 5-7 con/ chùm quả
Lúa	Bọ phấn trắng	1.0 lít/ha	14	Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi bọ phấn khoảng 5 con/khóm
Lúa	Nhện gié	0.8 – 1.2 lít/ha	14	Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi lúa ở giai đoạn làm đồng
Lúa	Sâu cuốn lá	1.0 lít/ha	14	Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu non tuổi 1-2 xuất hiện khoảng 10-20 con/m ² .
Lạc	Sâu khoang	1.0 lít/ha	14	Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi mật độ sâu khoảng 1-2 con/ cây
Đậu tương	Sâu xanh da láng	1.0 lít/ha	14	Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi mật độ sâu khoảng 1 con/ cây

HOẠT CHẤT

Pyriproxyfen

Quinalphos

THUỐC TRỪ BỆNH
MYFATOP

325sc



Cách dùng: lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5-10%.

Cây trồng Crop	Sinh vật gây hại Pest	Liều lượng Dosage	PHI (ngày)	Cách dùng Method of application
Lúa	Lem lép hạt	0.3 – 0.35 lít/ha	14	Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5-10%
Lúa	Đạo ôn	0.35 lít/ha		



Các nguyên tắc an toàn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là công dụng để kiểm soát dịch hại không thể thiếu trong trồng trọt hiện nay. Để thuốc BVTV phát huy tối đa hiệu quả phòng trừ đối tượng gây hại thì nhà nông cần phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc - Đúng liều - Đúng lúc - Đúng cách.

- Ngoài ra, khi sử dụng thuốc BVTV còn phải chú ý đến các nguyên tắc về an toàn sử dụng thuốc như là:
Thuốc phải được cất giữ nơi cao có khóa cẩn thận xa tầm với của trẻ em.
Đọc kỹ nhãn thuốc trước khi dùng. Chỉ dùng thuốc khi đã được đăng ký chính thức (ghi trên nhãn).
Mang dụng cụ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với thuốc như khẩu trang, găng tay,... lưu ý đặc biệt cho thuốc xử lý hạt giống.
Cẩn thận khi pha thuốc để tránh thuốc tiếp xúc vào da, mắt...
Kiểm tra bình phun trước khi sử dụng nên rửa bình phun kỹ trước và sau khi sử dụng.
Không phun ngược chiều gió.
Không ăn, uống trong khi tiếp xúc với thuốc.
Tắm rửa sạch sau khi tiếp xúc với thuốc.
Thu gom bao bì đã qua sử dụng, không vứt bừa bãi, đặc biệt là ở nơi gần nguồn nước.



Các hướng dẫn về an toàn

- - Phải đọc kỹ hướng dẫn ghi trên nhãn trước khi sử dụng.
- - Khi lấy thuốc, pha thuốc và phun rải thuốc phải mặc bảo hộ lao động phù hợp.
- - Không đi phun rải thuốc một mình ở nơi vắng người, không đi phun rải thuốc vào lúc trời nắng nóng, khi gió to. Không phun rải thuốc ngược chiều gió, đi vuông góc với chiều gió.
- - Không được ăn uống, hút thuốc khi đang phun rải thuốc.
- - Không sử dụng thiết bị phun rải thuốc bị rò rỉ, hư hỏng hoặc để thuốc dây lên da.
- - Giải lao: Chọn nơi thoáng mát, xa nơi phun rải thuốc.
- - Chỉ ăn uống, hút thuốc sau khi đã rửa tay, mặt mũi thật sạch.
- - Không chăn thả gia súc trong khi đang phun rải thuốc.
- - Ngừng ngay phun thuốc khi phát hiện bình bơm rò rỉ, xả van khí trong bình bơm, đổ nước thuốc ra chậu và tìm cách khắc phục.
- - Khi vòi phun bị tắc cần lên bờ, đến nơi sạch cỏ để tháo vòi rửa sạch. nếu bị tắc cần lấy cọng cây mềm để thông, không dùng miệng thổi để thông vòi.
- - Thay quần áo nếu quần áo đang mặc bị dính thuốc.
- - Không để trẻ em và phụ nữ mang thai tiếp xúc với thuốc BVTV.
- - Không làm nhiễm bẩn nguồn nước và môi trường khi sử dụng thuốc



Mang bảo hộ lao động,
khi sử dụng thuốc



Không phun ngược gió



Không gây ô nhiễm
môi trường



Đọc kỹ nhãn thuốc
trước khi sử dụng



Cất giữ thuốc nơi khô ráo,
xa tầm với của trẻ em



Tắm rửa, thay quần áo
sau khi sử dụng thuốc



Sau khi sử dụng thuốc

- + Dọn bao bì, chai thuốc vào một chỗ, tiêu huỷ đúng quy định. Không vứt bừa bãi hoặc tự ý đốt các bao bì chứa thuốc đã qua sử dụng.
- + Rửa thiết bị phun rải sạch sẽ, đúng cách (hoà xà phòng vào nước, đổ nước xà phòng vào bình, đóng nắp và lắc bình, đổ nước xà phòng ra xô - làm lại vài lần. Tháo rời từng bộ phận, dùng bàn chải mềm rửa sạch, thông vòi phun bằng nước xà phòng và nước sạch), rửa bên ngoài bằng nước xà phòng và nước sạch thêm lần nữa), úp ráo nước, cất vào kho. Không để bình bơm bừa bãi khi làm việc hay khi bảo quản.
- + Không đổ thuốc đã pha không sử dụng hết và nước súc rửa, vệ sinh thiết bị phun rải xuống ruộng, nguồn nước.
- + Tắm, giặt quần áo bảo hộ và công cụ bảo hộ lao động bằng xà phòng, thay quần áo mới, sạch. Không để chung quần áo bảo hộ với quần áo thường mặc và không để quần áo, công cụ phòng hộ trong kho thuốc.
- + Nước thuốc đã pha không dùng hết và nước rửa dụng cụ phun rải phải được đổ đúng nơi quy định, tránh làm ô nhiễm môi trường.



- ***Thời gian trở lại khu vực xử lý:**

Cần ngăn người và gia súc đi vào nơi mới xử lý thuốc. Trường hợp đặc biệt cần phải đi vào khu vực xử lý thuốc cần có quần áo bảo hộ. Thời gian trở lại khu vực xử lý dài hay ngắn tùy thuộc vào từng loại thuốc, thường là sau khi phun ít nhất 48 giờ.



***Sơ cấp cứu khi ngộ độc thuốc:**

- - Thuốc dây vào mắt: rửa mắt bằng nước sạch liên tục ít nhất là trong 15 phút.
- - Thuốc rò rỉ ra quần áo, thấm vào người: cởi bỏ hết quần áo bị dây thuốc, rửa sạch thuốc trên người nạn nhân bằng nước sạch và xà phòng.
- - Gây nôn cho nạn nhân nếu nạn nhân nuốt phải thuốc BVTV khi nạn nhân còn tỉnh táo.
- - Không được cho nạn nhân hút thuốc, uống rượu.
- - Đặt nạn nhân nằm ở tư thế ổn định, nếu nạn nhân bị nóng, sốt thì dùng khăn thấm nước lạnh để lau cho nạn nhân. Nếu nạn nhân cảm thấy lạnh thì dùng chăn đắp cho nạn nhân.
- - Nếu nạn nhân bị co giật cần lưu ý để giữ không cho nạn nhân cắn phải lưỡi.
- - Khi nạn nhân bất tỉnh, cần tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.
- - Sau đó chuyển bệnh nhân đến cơ quan y tế, nhớ luôn phải cầm theo nhãn thuốc BVTV.